



HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA
ARCOVERDE
HTRI – HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO



POP Nº 53 - HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM DÉFICIT NO AUTOCUIDADO, INCONSCIENTE OU INTUBADO.

OBJETIVO: Reduzir a colonização de micro-organismos, manter a integridade das mucosas, prevenir infecções orais, pulmonares e sistêmicas e promover bem estar.

COMPETÊNCIA: Enfermeiros e técnicos de enfermagem.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Gorro;
- Óculos de proteção;
- Máscara cirúrgica;
- Luvas;
- Espátula envolvida com gazes (3) ou escova de dente;
- Copo com água potável;
- Toalha;
- Creme dental ou solução dentifrícia;
- Solução antisséptica bucal (clorexidina a 0,12%), se necessário;

Em pacientes inconscientes ou intubados:

- Peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 0,2%;
- Seringa de 20ml com água potável, se necessário
- Abaixador de língua/espátula
- Sistema de aspiração montado (cateter de aspiração de nº 10 a 14, extensões de látex ou silicone)

PROTOCOLO:

- Explicar o procedimento a ser realizado, realizar o exame físico específico;
- Higienizar as mãos;
- Reunir os materiais e encaminhá-los ao leito;
- Colocar o cliente em posição de Fowler ou decúbito lateral, quando possível;

- Paramentar-se com os EPIs;
- Fazer escovação dos dentes em sentido de vai e vem utilizando escova e creme dental;
- Fazer a escovação da língua, palato e mucosa no sentido de trás pra frente com movimentos unidirecionais;
- Utilizar espátula envolvida com gaze para remover a saburra, se necessário;
- Solicitar ao cliente que faça bochecho com água e cuspir;
- Repetir a operação quantas vezes forem necessárias;
- Repetir o bochecho com solução antisséptica, quando prescrito.

Em paciente acamado inconsciente ou intubado:

- Verificar se a marca de referência na cânula orotraqueal está no nível da comissura labial;
- Aspirar a secreção;
- Verificar a pressão do balonete (cuff) da cânula de intubação;
- Abrir a boca do cliente, utilizar a espátula;
- Remover a cânula orofaríngea (Guedel), quando houver;
- Umedecer a escova dental ou espátula envolvida com solução dentifrícia;
- Higienizar os dentes e as gengivas nos sentidos de cima para baixo e de trás para frente, incluindo superfícies internas e externas;
- Utilizar espátula envolvida com gaze para remover a saburra, repetir o procedimento se necessário;
- Injetar a água contida na seringa de 20 mL na cavidade bucal, aspirando-a com o cateter, simultaneamente.
- Utilizar 15 ml de solução antisséptica ou clorexidina a 0,12% embebida em gaze de 12 em 12 horas, visando a prevenção de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica - PAV desde o momento da intubação orotraqueal;
- Aspirar o resíduo do antisséptico bucal, utilizando o cateter de aspiração;
- Colocar a uma nova cânula orofaríngea, se necessário;
- Guardar o material e realizar registro do procedimento.

OBSERVAÇÕES:

Pacientes suspeito ou confirmado para COVID-19: Manter Protocolo Operacional Padrão Nº 54- POP HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

UFTM - Procedimento Operacional Padrão Higiene Bucal, 2016.

<http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/pop+higiene+bucal.pdf/35812326-8cf2-4d56-a5db-4dff59bfeb22>. Acesso em 13/04/20