



HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA
ARCOVERDE
HTRI – HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO



POP Nº 54 - HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).

OBJETIVO: Redução da carga viral, antes da higiene bucal e Prevenção de pneumonias associada a ventilação mecânica (PAV).

COMPETÊNCIA: Enfermeiros e técnicos de enfermagem.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Gorro;
- Óculos de proteção e protetor facial (Face shield);
- Máscara N95 (PFF2) ou equivalente;
- Avental impermeável;
- Luvas;
- Gaze;
- Peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 0,2%;
- Clorexidina a 0,12%.

PROTOCOLO:

Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 que estiverem submetidos a traqueostomia ou intubação orotraqueal:

- Aplicar gaze embebidos em 15 ml de peróxido de hidrogênio de 0,5% a 1% ou povidona a 0,2% por 1 minuto, 2 vezes ao dia antes da higiene bucal com clorexidina, visando a redução da carga viral.
- Utilizar 15 ml de clorexidina a 0,12% embebida em gaze de 12 em 12 horas visando a prevenção de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica - PAV desde o momento da intubação orotraqueal.

Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 conscientes orientados e em ar ambiente:

- Realizar bochecho de 15 ml de peróxido de hidrogênio de 0,5% a 1% ou povidona a 0,2% por um minuto, 1 vez ao dia.
- Realizar a higiene bucal com clorexidina a 0,12%, conforme POP Nº 53

OBSERVAÇÕES:

Pacientes com risco descartado para COVID-19: Manter Protocolo Operacional Padrão Nº 53 - POP HIGIENE BUCAL EM PACIENTES COM DÉFICIT NO AUTOCUIDADO, INCONSCIENTE OU INTUBADO.

Pacientes com suspeita ou confirmação do COVID19 que fazem uso de dispositivos protéticos bucais, quando retirados, NÃO armazenar no hospital. Estes dispositivos deverão ser entregues, devidamente desinfetados, a um responsável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 atualizada em 31/03/2020.

Orientações para serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2).

POP de Higiene Bucal da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), 2019.